

Portaria nº 1.522, de 19 de dezembro de 1.989

O PRESIDENTE DO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº 7,735, de 22 de fevereiro de 1.989, publicada no Diário Oficial da União de 23 de fevereiro de 1.989.

RESOLVE:

Art. 1º - Reconhecer como Lista Oficial de Espécies da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção, a seguinte relação:

1.0. Mammalia

1.1. Primates

- Alouatta belzebul belzebul** (Linnaeus, 1766). Família **Cebidae**. Nome popular: guariba.
Alouatta fusca (E. Geoffroy, 1812). Família **Cebidae**. Nome popular: barbado, guariba.
Ateles belzebuth (E. Geoffroy, 1806). Família **Cebidae**. Nome popular: macaco-aranha.
Ateles paniscus (Linnaeus, 1758). Família **Cebidae**. Nome popular: macaco-aranha.
Brachyteles acrachnoides (E. Geoffroy, 1806). Família **Cebidae**. Nome popular: muriqui, mono-carvoeiro.
Cacajao calvus (I. Geoffroy, 1847). Família **Cebidae**. Nome popular: uacari.
Cacajao melanocephalus (Humbolt, 1812). Família **Cebidae**. Nome popular: uacari-preto.
Callicebus parsonatus (E. Geoffroy, 1812). Família **Cebidae**. Nome popular: guigó, sauá.
Callimico goeldii (Thomas, 1904). Família **Callimiconidae**. Nome popular: calimico.
Callithrix argentata leucippe (Thomas, 1922). Família **Callitrichidae**. Nome popular: sagui.
Callithrix aurita (Humbolt, 1812). Família **Callitrichidae**. Nome popular: sagui-da-serra-escuro.
Callithrix flaviceps (Thomas, 1903). Família **Callitrichidae**. Nome popular: sagui-da-serra.
Callithrix humeralifer (E. Geoffroy, 1812). Família **Callitrichidae**. Nome popular: sagui.
Cebus apella xanthosternos (Wied, 1820). Família **Cebidae**. Nome popular: macaco-prego-do-peito-amarelo.
Chiropotes albinus (I. Geoffroy & Deville, 1848). Família **Cebidae**. Nome popular: cuxiu-de-nariz-branco.
Chiropotes satanas utahicki (Herskovitz, 1.985). Família **Cebidae**. Nome popular: cuxiu.
Chiropotes satanas satanas (Hoffmansegg, 1807). Família **Cebidae**. Nome popular: cuxiu.
Lagothrix lagotricha (Humbolt, 1812). Família **Cebidae**. Nome popular: barrigudo.
Leontopithecus chrysomelas (Kuhl, 1820). Família **Callitrichidae**. Nome popular: mico-leão-de-cara-dourada.
Leontopithecus chrysopygus (Mikan, 1923). Família **Callitrichidae**. Nome popular: mico-leão-preto.
Leontopithecus rosalia (Linnaeus, 1766). Família **Callitrichidae**. Nome popular: mico-leão-dourado
Pithecia albicans (Gray, 1860). Família **Cebidae**. Nome popular: parauacu-branco
Saguinus bicolor (Spix, 1823). Família **Callitrichidae**. Nome popular: soim-de-coleira.
Saguinus imperator (Goeldi, 1907). Família **Callitrichidae**. Nome popular: sagui-bigodeiro.
Saimiri vanzolinii (Ayres, 1985). Família **Cebidae**. Nome popular: mico-de-cheiro

1.2. Carnivora

- Atelocynus microtis** (Scalter, 1883). Família **Canidae**. Nome popular: cachorro-do-mato-de-orelha-curta.
Chrysocyon brachyurus (Illiger, 1815). Família **Canidae**. Nome popular: lobo-guará, guará, lobo-vermelho,
Felis colocolo (Molina, 1810). Família **Felidae**. Nome popular: gato-palheiro
Felis concolor (Linnaeus, 1771). Família **Felidae**. Nome popular: sussuarana, onça-parda.
Felis geoffroyi (d'Orbigny & Gervais, 1844). Família **Felidae**. Nome popular: gato-do-mato.
Felis pardalis (Linnaeus, 1758). Família **Felidae**. Nome popular: jaguatirica.
Felis tigrina (Scheber, 1775). Família **Felidae**. Nome popular: gato-do-mato.
Felis wiedii (Schinz, 1821). Família **Felidae**. Nome popular: gato-do-mato, maracajá.
Grammogale africana (Desmarest, 1818). Família **Mustelidae**. Nome popular: doninha amazônica.
Lutra longicaudis (Olfers, 1818). Família **Mustelidae**. Nome popular: lontra.
Panthera onca (Linnaeus, 1758). Família **Felidae**. Nome popular: onça-pintada, canguçu, onça-canguçu, jaguar-canguçu
Pteronura brasiliensis (Gmelin, 1788). Família **Mustelidae**. Nome popular: ariranha.
Speothos vinaticus (Lund, 1842). Família **Canidae**. Nome popular: cachorro-do-mato-vinagre.

1.3. Xenarthra

- Bradypus torquatus** (Desmarest, 1816). Família **Bradypodidae**. Nome popular: preguiça-de-coleira.
Myrmecophaga tridactyla (Linnaeus, 1758). Família **Myrmecophagidae**. Nome popular: tamanduá-bandeira.
Priodontes maximus (Kerr, 1792). Família **Dasypodidae**. Nome popular: tatu-canastra, tatuçu.

Tolypeutes tricintinus (Linnaeus, 1758). Família **Dasyopodidae**. Nome popular: tatu-bola, tatuapara.

1.4. Sirenia

Trichechus inunguis (Natterer, 1883). Família **Trichechidae**. Nome popular: peixe-boi, guarabá.

Trichechus manatus (Linnaeus, 1758). Família **Trichechidae**. Nome popular: peixe-boi-marinho, manati.

1.5 Cetacea

Eubalena australis (Desmoulins, 1822). Família **Baleanidae**. Nome popular: baleia-franca, baleia-franca-austral.

Megaptera novaeangliae (Borowsky, 1781). Família **Balaenopteridae**. Nome popular: jubarte.

Pontoporia blainvillei (Gervais & d'Orbigny). Família **Pontoporiidae**. Nome popular: toninha, boto-cachimbo.

1.6 Rodentia

Abrawayaomys ruschii (Cunha & Cruz, 1979). Família **Cricetidae**.

Chaetomis subspinosus (Olfers, 1818). Família **Erethizontidae**. Nome popular: ouriço-preto.

Juscelinomys candango (Moojen, 1965). Família **Cricetidae**.

Kunsia tomentosus (Lichtenstein, 1830). Família **Cricetidae**.

Phanomys ferrugineus (Thomas, 1894). Família **Cricetidae**. Nome popular: rato-do-mato-ferrugíneo.

Rhagomys rufescens (Thomas, 1886). Família **Cricetidae**. Nome popular: rato-do-mato-laranja.

Wilfredomys oenax (Thomas, 1928). Família **Cricetidae**. Nome popular: rato-do-mato.

1.7 Artiodactyla

Blastocerus dichotomus (Illiger, 1815). Família **Cervidae**. Nome popular: cervo-do-pantanal.

Odocoileus virginianus (Zimmermann, 1780). Família **Cervidae**. Nome popular: cariacu.

Ozotocerus bezoarticus (Linnaeus, 1758). Família **Cervidae**. Nome popular: veado-campeiro.

2.0. Aves

2.1. Tinamiformes

Crypturellus noctivagus (Wied, 1820). Família **Tinamidae**. Nome popular: jaó-do-sul, zabelê, juó.

Nothura minor (Spix, 1825). Família **Tinamidae**. Nome popular: codorna-mineira, codorna-buraqueira, buraqueira.

Taoniscus nanus (Temminck, 1815). Família **Tinamidae**. Nome popular: codorna-buraqueira, perdigão, inhambu-carapé.

Tinamus solitarius (Vieillot, 1819). Família **Tinamidae**. Nome popular: macuco, macuca.

2.2. Ciconiiformes

Eudocimus ruber (Linnaeus, 1758). Família **Threskiornithidae**. Nome popular: guará.

Tigrisoma fasciatum fasciatum (Such, 1825). Família **Ardeidae**. Nome popular: socó-boi.

2.3. Phoenicopteriformes

Phoenicopterus ruber (Linnaeus, 1758). Família **Phoenicopteridae**. Nome popular: ganso-do-norte, ganso-cor-de-rosa, maranhão, flamingo.

2.4. Anseriformes

Mergus octosetaceus (Vieillot, 1817). Família **Anatidae**. Nome popular: mergulhão, patão, pato-mergulhão.

2.5. Falconiformes

Accipiter poliogaster (Temminck, 1824). Família **Accipitridae**. Nome popular: tauató-pintado, gavião-pombo-grande.

Falco deiroleucus (Temminck, 1825). Família **Falconidae**. Nome popular: falcão-de-peito-vermelho.

Harpia harpyja (Linnaeus, 1758). Família **Accipitridae**. Nome popular: gavião-real, gavião-de-penacho,, uiraçu-verdadeiro.cutucurim, harpia.

Harpyhaliaetus coronatus (Vieillot, 1817). Família **Accipitridae**. Nome popular: águia-cinzenta.
Leucopternis lacernulata (Temminck, 1827). Família **Accipitridae**. Nome popular: gavião-pomba.
Leucopternis polionota (Kaup, 1847). Família **Accipitridae**. Nome popular: gavião-pomba
Morphnus guianensis (Daudin, 1800). Família **Accipitridae**. Nome popular: gavião-de-penacho, uiraçu-falso.
Spizastus melanoleucus (Vieillot, 1816). Família **Accipitridae**. Nome popular: gavião-preto, gavião-pato.

2.6. Galliformes

Crax blumembachii (Spix, 1825). Família **Cracidae**. Nome popular: mutum-do-sudeste.
Crax fasciolata pinima (Pelzeln, 1870). Família **Cracidae**. Nome popular: mutum-de-penacho, mutum-pinima.
Mitu mitu mitu (Linnaeus, 1766). Família **Cracidae**. Nome popular: mutum-cavalo, mutum-etê, mutum-da-várzea, mutum-piry, mutum-do-nordeste.
Penelope jacucaca (Spix, 1825). Família **Cracidae**. Nome popular: jacucaca.
Penelope obscura bronzina (Hellmayr, 1914). Família **Cracidae**. Nome popular: jacuguaçu, jacuaçu.
Penelope ochrogaster (Pelzeln, 1870). Família **Cracidae**. Nome popular: jacu-de-barriga-castanha.
Pipile jacutinga (Spix, 1825). Família **Cracidae**. Nome popular: jacutinga.

2.7. Charadriiformes

Numenius borealis (Forster, 1772). Família **Scolopacidae**. Nome popular: maçarico-esquimó.

2.8. Columbiformes

Claravis godefrida (Temminck, 1811). Família **Columbidae**. Nome popular: pararu, pomba-de-espelho.
Columbina cyanopis (Pelzeln, 1870). Família **Columbidae**. Nome popular: rolinha-do-planalto, rolinha-do-Brasil-central.

2.9. Psittaciformes

Amazona brasiliensis (Linnaeus, 1758). Família **Psittacidae**. Nome popular: papagaio-da-cara-roxa, chauá.
Amazona petrei (Temminck, 1830). Família **Psittacidae**. Nome popular: chorão, charão, papagaio-da-serra, serrano.
Amazona rhodocorytha (Salvadori, 1890). Família **Psittacidae**. Nome popular: Chauá-verdadeiro, jauá, acumatanga, camutanga.
Amazona vinacea (Huhl, 1820). Família **Psittacidae**. Nome popular: papagaio-de-peito-roxo, papagaio-caboclo, papagaio-curraleiro, jurueba.
* **Anodorhynchus glaucus** (Vieillot, 1816). Família **Psittacidae**. Nome popular: arara-azul-pequena.
Anodorhynchus hyacinthinus (Latham, 1720). Família **Psittacidae**. Nome popular: arara-azul-grande, ararauna
Anodorhynchus leari (Bonaparte, 1857). Família **Psittacidae**. Nome popular: arara-azul-de-Lear.
Aratinga guarouba (Gmlin, 1788). Família **Psittacidae**. Nome popular: guaruba, ararajuba.
Cyanopsitta spixii (Wagler, 1832). Família **Psittacidae**. Nome popular: ararinha-azul.
Pyrrhura cruentata (Wied, 1820). Família **Psittacidae**. Nome popular: tiriba, fura-mato, cara-suja.
Pyrrhura leucotis (Kuhl, 1820). Família **Psittacidae**. Nome popular: fura-mato, tiriba-de-orelha-branca
Touit melanonota (Wied, 1820). Família **Psittacidae**. Nome popular: apuim-de-cauda-vermelha.
Touit surda (Kuhl, 1820). Família **Psittacidae**. Nome popular: apuim-de-cauda-amarela.
Triclaria malachitacea (Spix, 1824). Família **Psittacidae**. Nome popular: sabiá-cica, araquaiava.

2.10. Cuculiformes

Neomorphus geoffroyi dulcis (Snethlage, 1927). Família **Cuculidae**. Nome popular: aracução, jacu-molambo, jacu-porco, jacu-verde, jacu-taquara.
Neomorphus geoffroyi geoffroyi (Temminck, 1820). Família **Cuculidae**. Nome popular: jacu-estalo.

2.11. Caprimulgiformes

Caprimulgus candicans (Pelzeln, 1867). Família **Caprimulgidae**. Nome popular: bacurau, rabo-branco.
Eleothreptus anomalus (Gould, 1837). Família **Caprimulgidae**. Nome popular: curiango-do-banhado.
Macropsalis creagra (Bonaparte, 1850). Família **Caprimulgidae**. Nome popular: bacurau, tesoura-gigante.
Nyctibius leucopterus (Wied, 1821). Família **Nyctibiidae**. Nome popular: mãe-da-lua.

2.12. Apodiformes

Phaethornis superciliosus margarettae (Ruschi, 1972). Família **Trochilidae**. Nome popular: besourão-de-rabo-branco.

Ramphodon dohrnii (Boucier & Mulsant, 1852). Família **Trochilidae**. Nome popular: balança-rabo-canela.

2.13. Piciformes

Campephilus robustus (Lichtenstein, 1819). Família **Picidae**. Nome popular: pica-pau-rei.

Celeus torquatus tinnunculus (Wagler, 1829). Família **Picidae**. Nome popular: pica-pau-de-coleira.

Dryocopus galeatus (Temminck, 1822). Família **Picidae**. Nome popular: pica-pau-de-cara-amarela.

Jacamaralcyon tridactyla (Vieillot, 1817). Família **Galbulidae**. Nome popular: cuitelão, bicudo, violeiro.

2.14. Passeriformes

Amaurospiza moesta (Hartlaub, 1853). Família **Emberizidae**. Nome popular: negrinho-do-mato.

Alectrurus risoria (Vieillot, 1824). Família **Tyrannidae**. Nome popular: galito, tesoura-do-campo, bandeira-do-campo.

Anthus nattereri (Sclater, 1878). Família **Motacillidae**. Nome popular: caminheiro-grande.

***Calyptura cristata** (Vieillot, 1818). Família **Cotingidae**. Nome popular: tietê-de-coroa.

Carduelis yarrellii (Audubon, 1839). Família **Emberizidae**. Nome popular: coroinha, pintassilgo-do-nordeste.

Carpornis malanocephalus (Wied, 1820). Família **Cotingidae**. Nome popular: sabiá-pimenta.

Cercomacra carbonaria (Sclater & Salvin, 1873). Família **Formicariidae**.

Clibanornis dendrocolaptoides (Pelzeln, 1859). Família **Furnariidae**.

Conothraupis mesoleuca (Berlioz, 1939). Família **Emberizidae**.

Cotinga maculata (Müller, 1776). Família **Cotingidae**. Nome popular: crejoá, quiruá, catingá.

Culicivora caudacuta (Vieillot, 1818). Família **Tyrannidae**. Nome popular: papa-moscas-do-campo.

Curaeus forbesi (Sclater, 1886). Família **Icteridae**. Nome popular: anumará.

Dacnis nigripes (Pelzeln, 1856). Família **Emberizidae**. Nome popular: saí-de- pernas-pretas.

Formicivora erythronotos (Hartlaub, 1852). Família **Formicariidae**.

Formicivora iheringi (Hellmayr, 1909). Família **Formicariidae**. Nome popular: papa-formiga.

Gubernatrix cristata (Vieillot, 1817). Família **Emberizidae**. Nome popular: cardeal-amarelo.

Hemitriccus aenigma (Zimmer, 1940). Família **Tyrannidae**.

Hemitriccus furcatus (Lafresnaye, 1846). Família **Tyrannidae**. Nome popular: papa-moscas-estrela.

Hemitriccus kaempferi (Zimmer, 1953). Família **Tyrannidae**.

Herpsilochmus pectoralis (Sclater, 1857). Família **Formicariidae**.

Iodopleura pipra (Lesson, 1831). Família **Cotingidae**. Nome popular: anambezinho.

Lipaugus lanioides (Lesson, 1844). Família **Cotingidae**. Nome popular: sabiá-da-mata- virgem, sabiá-do-mato-grosso, sabiá-da-serra, virussu, tropeiro-da-serra.

Megaxenops paraguayae (Reiser, 1905). Família **Furnariidae**. Nome popular: bico-virão-da-caatinga.

Merulaxis stresemanni (Sick, 1960). Família **Rhinocryptidae**.

Myadestes leucogenys leucogenys (Cabanis, 1851). Família **Turdidae**. Nome popular: sabiá-castanho.

Myrmeciza ruficauda (Wied, 1831). Família **Formicariidae**.

Myrmeciza stictothorax (Todd, 1927). Família **Formicariidae**.

Myrmotherula minor (Salvadori, 1867). Família **Formicariidae**. Nome popular: choquinha.

Nemosia roourei (Cabanis, 1870). Família **Emberizidae**. Nome popular: saíra-apunhalada.

Oryzoborus maximiliani (Cabanis, 1851). Família **Emberizidae**. Nome popular: bicudo, bicudo-verdadeiro, bicudo-preto.

Phibalura flavirostris (Vieillot, 1816). Família **Cotingidae**. Nome popular: tesourinha.

Phylloscartes ceciliae (Teixeira, 1987). Família **Tyrannidae**.

Phylloscartes roquettei (Sneath, 1928). Família **Tyrannidae**.

Philydor novaesi (Teixeira & Gonzaga, 1983). Família **Furnariidae**.

Pipitres pileatus (Temminck, 1822). Família **Cotingidae**. Nome popular: cameleirinho-de-chapéu-preto.

Platyrrinchus leucoryphus (Wied, 1831). Família **Tyrannidae**. Nome popular: patinho-gigante.

Poecilurus kollari (Pelzeln, 1856). Família **Furnariidae**.

Poospiza cinerea (Bonaparte, 1850). Família **Emberizidae**. Nome popular: andorinha-do-oco-do-pau.

Procnias averano averano (Hermann, 1783). Família **Cotingidae**. Nome popular: araponga-do-nordeste, guiraponga.

Pyriglena atra (Swainson, 1825). Família **Formicariidae**. Nome popular: papa-formigas.

Pyroderus scutatus scutatus (Shaw, 1792). Família **Cotingidae**. Nome popular: pavoá, pavão, pavó, pavão-do-mato.

Rhopornis ardesiaca (Wied, 1831). Família **Formicariidae**. Nome popular: papa-formigas-de-gravatá

Scytalopus novacapitalis (Sick, 1958). Família **Rhinocryptidae**.

Sporophila falcirostris (Temminck, 1820). Família **Emberizidae**. Nome popular: papa-capim, cigarra-verdadeira.

Sporophila frontalis (Verreaux, 1869). Família **Emberizidae**. Nome popular: pichochó, papa-arroz.

Sporophila palustris (Barrows, 1883). Família **Emberizidae**. Nome popular: caboclinho-de-papo-branco.

Sturnella defilippii (Bonaparte, 1851). Família **Icteridae**. Nome popular: peito-vermelho-grande.

Synallaxis infuscata (Pinto, 1950). Família **Furnariidae**.

Tangara fastuosa (Lesson, 1831). Família **Emberizidae**. Nome popular: pintor-verdadeiro.

Terenura sicki (Teixeira & Gonzaga, 1983). Família **Formicariidae**.

Thamnomanes plumbeus (Wied, 1831). Família **Formicariidae**.

Thripophafa macroura (Wied, 1821). Família **Furnariidae**. Nome popular: rabo-amarelo.

Xanthopsar flavus (Gmelin, 1788). Família **Icteridae**. Nome popular: pássaro-preto-de-veste-amarela

Xiphocolaptes falcirostris (Spix, 1824). Família **Dedrocolaptidae**. Nome popular: arapaçu-do-nordeste.

Xiphocolaptes franciscanus (Snethlage, 1927). Família **Dendrocolaptidae**. Nome popular: arapaçu.

Xipholena atropurpurea (Wied, 1820). Família **Cotingidae**. Nome popular: amambé-de-asa-branca, cotinga, ferrugem.

3.0. Reptilia

3.1. Chelonia

Caretta caretta (Linnaeus, 1758). Família **Chelonidae**. Nome popular: cabeçuda, tartaruga-meio-pente.

Chelonia mydas (Linnaeus, 1758). Família **Chelonidae**. Nome popular: tartaruga-verde.

Dermodochelys coriacea (Linnaeus, 1758). Família **Chelonidae**. Nome popular: tartaruga-de-couro, tartaruga-gigante, tartaruga-de-pele.

Eretmochelis imbricata (Linnaeus, 1766). Família **Chelonidae**. Nome popular: tartaruga-de-pente.

Lepidochelys olivacea (Escholtz, 1829). Família **Chelonidae**.

Phrynosops hogei (Mertens, 1967). Família **Chelidae**.

3.2 Squamata

Lachesis muta rhombeata (Wied, 1825). Família **Viperidae**. Nome popular: surucucu-pico-de-jaca, surucucu.

3.3 Crocodilia

Caiman latirostris (Daudin, 1802). Família **Crocodylidae**. Nome popular: jacaré-de-papo-amarelo.

Melanosuchus niger (Spix, 1825). Família **Crocodylidae**. Nome popular: jacaréaçu.

4.0 Amphibia

Paratelmatobius gaigeae (Cochran, 1938). Família **Leptodactylidae**.

5.0 Insecta

5.1 Lepidoptera

* **Dasyophthalma vertebralis** (Butler, 1869). Família **Nymphalidae**.

Eresia erysice (Geyer, 1832). Família **Nymphalidae**.

* **Eurytides iphitas** Hübner, 1821). Família **Papilionidae**.

Eurytides lysithous harrisinus (Swainson, 1822). Família **Papilionidae**.

Eutresis hypareia imeriensis (Brown, 1977). Família **Nymphalidae**.

Heliconius nattereri (Felder & Felder, 1865). Família **Nymphalidae**.

* **Hyaliris fiammetta** (Hewitson, 1852). Família **Nymphalidae**.

* **Hyaliris leptalina leptalina** (Felder & Felder, 1865). Família **Nymphalidae**.

Hypoleria fallens (Haensch, 1905). Família **Nymphalidae**.

Hypoleria mulviana (D'Almeida, 1945). Família **Nymphalidae**.

Joiceya praeclara (Talbot, 1928). Família **Lyceanidae**.
Mechanitis bipuncta (Forbes, 1948). Família **Nymphalidae**.
Melinaea mnaisas (Hewitson, 1855). Família **Nymphalidae**.
Moschoneura methymna (Godart, 1819). Família **Pieridae**.
Napeogenis cyrianassa xanthone (Bates, 1862). Família **Nymphalidae**.
Orobassolis ornamentalis (Stichel, 1906). Família **Nymphalidae**.
Papilio himeros himeros (Höpffer, 1866). Família **Papilionidae**.
Papilio himeros baia (Hothschild & Jordan, 1906). Família **Papilionidae**.
Papilio zagreus zagreus (Doubleday, 1847). Família **Papilionidae**.
Papilio zagreus neyi (Niepelt, 1909). Família **Papilionidae**.
Papilio zagreus bedoci (Le Cerf, 1925). Família **Papilionidae**.
Parides ascanius (Cramer, 1775). Família **Papilionidae**.
Parides lysander mattogrossensis (Talbot, 1928). Família **Papilionidae**.
Perrhybris flava (Oberthür, 1895). Família **Pieridae**.
Scada karschina delicata (Talbot, 1932). Família **Nymphalidae**.

5.2 Odonata - Libélulas

Leptarigon dardanoi (Santos, 1968). Família **Coenagrionidae**.
Leptarigon siqueirai (Santos, 1968). Família **Coenagrionidae**.
Mecistogaster asticta (Selys, 1860). Família **Pseudostigmatidae**.
* **Mecistogaster pronoti** (Sjoestedt, 1918). Família **Pseudostigmatidae**.

6.0 Onychophora

Peripatus acacioli (Marcus & Marcus, 1955). Família **Peripatidae**.

7.0 Cnidaria

Millepora nitidae (Verreill, 1868). Família **Milleporidae**. Nome popular: coral-de-fogo.

* Espécies provavelmente extintas

Art. 2º - Os animais constantes desta relação ficam protegidos de modo integral, de acordo com o estabelecido na Lei nº 5.197, de 3 de janeiro de 1.967.

Art. 3º - A não observância da presente Portaria constitui infração sujeita às penalidades previstas na Lei nº 5.197, de 3 de janeiro de 1.967 e na Lei 7.653, de 12 de fevereiro de 1.988, sem prejuízo dos dispositivos previstos no Código Penal e demais leis vigentes, com as penalidades nelas consideradas.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, e revoga a Portaria nº 3.481, de 31 de maio de 1.973 e todas as disposições em contrário.

Fernando Cesar de Moreira Mesquita
Presidente

Portaria nº 45-N, de 27 de abril de 1.992

A PRESIDENTE DO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº 7.735, de 23 de fevereiro de 1.989, e artigo 83, ítem XIV/ do Regimento Interno, aprovado pela Portaria MINTER nº 445, de 16 de agosto de 1.989, RESOLVE:

Art. 1º - Incluir no ítem 1.0 Mammalia, sub-ítem 1.2 Primates, da Portaria 1.522, de 19 de dezembro de 1.989, a espécie Leontopithecus caissara (1.990) Família CALLITRICHIDAE, nome popular mico-leão-da-cara-preta (Paraná e São Paulo).

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário

Maria Tereza Jorge Pádua

Presidente

(Of. nº 405/92)

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, DOS RECURSOS HÍDRICOS E DA AMAZÔNIA LEGAL
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

PORTARIA Nº 062 DE 17 DE JUNHO DE 1.997

O PRESIDENTE DO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº 7.735, de 23 de fevereiro de 1.989, e artigo 83, item XIV/ do Regimento Interno, aprovado pela Portaria MINTER nº 445, de 16 de agosto de 1.989;

considerando o resultado do Workshop sobre Conservação dos Morcegos Brasileiros, realizado em Santa Tereza - ES, constante no Processo IBAMA nº02001.004037/96-84; e

considerando o resultado das pesquisas com o bicudinho-do-brejo, realizada pelos pesquisadores do Museu de História Natural "Capão da Imbuia, Curitiba, constante no Processo IBAMA nº 02001.000454/96-30, RESOLVE:

Art. 1º - Incluir no Artigo 1º da Portaria 1.522, de 19 de dezembro de 1.989, item 1.0 MAMMALIA, o sub-ítem 1.8 QUIROPTERA, as seguintes espécies de morcegos ameaçados de extinção no Brasil :

- *Saccopteryx gymnura* (Thomas, 1901) Família EMBALLONURIDAE
- *Vampyrum spectrum* (Linnaeus, 1758) Família PHYLLOSTOMIDAE
- *Lonchophylla bokermanni* (Sazima et al., 1978) Família PHYLLOSTOMIDAE
- *Lichonycteris obscura* (Thomas, 1895) Família PHYLLOSTOMIDAE
- *Chiroderma doriae* (Thomas, 1901) Família PHYLLOSTOMIDAE
- *Platyrrhinus recifinus* (Thomas, 1901) Família PHYLLOSTOMIDAE
- *Lasiurus ebenus* (Fazzolari-Corrêa, 1994) Família VESPERTILIONIDAE
- *Lasiurus egyptus* (Peters, 1870) Família VESPERTILIONIDAE
- *Myotis ruber* (E. Geoffroy, 1806) Família VESPERTILIONIDAE

Art. 2º - Incluir no Artigo 1º da Portaria 1.522, de 19 de dezembro de 1.989, item 2.0 AVES, sub-ítem 2.14 PASSERIFORMES, a espécie *Stynphalornis acutirostris* (Bornschein, Reinet & Teixeira; 1995) Família FORMICARIIDAE - Nome popular: bicudinho-do-brejo (Paraná).

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

EDUARDO DE SOUZA MARTINS
Presidente

Publicado no D.O.U de 18/06/97 Seção 1 -Página 12659 em 18/06/1997

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, DOS RECURSOS HÍDRICOS E DA AMAZÔNIA LEGAL
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

PORTARIA Nº 28 de 12 de março de 1.998

O PRESIDENTE DO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº 7.735, de 22 de fevereiro de 1.989, e artigo 83, item XIV/, do Regimento Interno, aprovado pela Portaria MINTER nº 445, de 16 de agosto de 1.989;

- considerando as pesquisas com fauna silvestre em cavernas brasileiras realizadas na Província Espeleológica do Alto Ribeira- SP, pelo Departamento de Zoologia do Instituto de Biociência da Universidade de São Paulo - USP que apontam para um declínio populacional recente e para o risco de extinção de algumas espécies; e

- tendo em vista o contido no Processo IBAMA nº 02001.000229/98-65, RESOLVE:

Art. 1º - Incluir no Artigo 1º da Portaria 1.522, de 19 de dezembro de 1.989, os seguintes itens:

8.0 PISCES

8.1 SILURIFORMES

- *Pimelodella cf. kronei* (Trajano, 1997) Família PIMELODIDADE - Nome popular: bagre-cego (Província Espeleológica do Alto Ribeira - SP).

9.0 CRUSTACEA

9.1 DECAPODA

- *Aegla microphthalma* (Bond-Buchup & Buckap, 1994) Família Aeglidæ - Nome popular: aegla (Província Espeleológica do Alto Ribeira - SP).

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

EDUARDO DE SOUZA MARTINS
Presidente

Publicado no D. O. U nº 50 de 16/03/98 Seção I Página 62